

Examenul de bacalaureat național 2025 – Simulare la nivelul județului Giurgiu

Proba E. d)
Fizică

Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională – profilul militar

· Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ȘI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ

· Se acordă 10 puncte din oficiu.

· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

Se consideră: numărul lui Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, constanta gazelor ideale $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Între parametrii de stare ai gazului ideal într-o stare dată există relația: $p \cdot V = \nu RT$.

I. Pentru itemii 1-5 scrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte)

1. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, unitatea de măsură din S.I. a mărimii exprimate prin raportul $pV\mu/RT$ este:

- a. $\text{J} \cdot \text{mol} \cdot \text{K}^{-1}$ b. $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}$ c. kg d. $\text{kg} \cdot \text{m}^3$ (3p)

2. Căldura necesară pentru a încălzi o bucată de plumb având masa $m = 500 \text{ g}$ ($C_{\text{plumb}} = 125 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$) cu $\Delta t = 20^\circ\text{C}$ este egală cu:

- a. 2500 kJ b. 1250 kJ c. 2500 J d. 1250 J (3p)

3. O cantitate dată de gaz ideal se destinde adiabetic dintr-o stare în care temperatura este T_1 , până într-o stare în care temperatura devine T_2 . Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior poate fi exprimat prin:


- a. $L = \nu C_V (T_2 - T_1)$ b. $L = \nu C_V (T_1 - T_2)$ c. $L = \nu C_p (T_1 - T_2)$ d. $L = \nu C_p (T_2 - T_1)$ (3p)

4. Densitatea unei cantități date de gaz ideal crește într-o:

- a. răcire izobară b. încălzire izobară c. destindere izotermă d. încălzire izocoră (3p)

5. Un gaz ideal parcurge succesiunea de transformări reprezentate în coordonate $p - V$ în figura alăturată. Transformarea în care gazul primește căldură, fără să efectueze lucru este:

- a. 1-2
b. 2-3
c. 3-4
d. 4-1



(3p)

II. Rezolvați următoarea problemă:

(15 puncte)

Într-o butelie se află $m = 48 \text{ g}$ de oxigen ($\mu = 32 \text{ g/mol}$), considerat gaz ideal. Gazul, aflat inițial în starea 1 în care temperatura este $t_1 = 7^\circ\text{C}$ și presiunea $p_1 = 4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, este încălzit până în starea 2 în care temperatura devine $t_2 = 77^\circ\text{C}$. Ulterior, se consumă $\Delta m = 6 \text{ g}$ din oxigenul aflat în butelie. În final, în starea 3, temperatura oxigenului rămas în butelie este $t_3 = t_1 = 7^\circ\text{C}$. Căldura molară izocoră a oxigenului este $C_V = 2,5R$. Determinați:

- a. căldura necesară încălzirii oxigenului de la temperatura t_1 la temperatura t_2 ;
b. presiunea maximă atinsă de oxigenul din butelie în cursul transformării 1- 2 - 3;
c. densitatea gazului în starea finală 3;
d. variația energiei interne a oxigenului în transformarea 1- 2 - 3 .

III. Rezolvați următoarea problemă:

(15 puncte)

O cantitate $\nu = 1,5$ mol de gaz ideal monoatomic ($C_V = 1,5R$), aflat inițial în starea 1 la temperatura $t_1 = 47^\circ\text{C}$, evoluează după un proces termodinamic ciclic $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ reprezentat în coordonate p - V în figura alăturată. Se știe că presiunea în starea 2 este $p_2 = 2p_1$. Calculați:

- temperatura gazului în starea 3;
- lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în decursul procesului ciclic;
- căldura schimbată de gaz pe transformarea $3 \rightarrow 1$;
- randamentul unui ciclu Carnot care ar funcționa între temperaturile extreme atinse în procesul $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$.

